



Motto: respect

Vrouwenbesnijdenis is eeuwenoude traditie, die nog steeds in veel landen voorkomt. Uit onderzoek is er gebleken dat dit niet gesteund is door religie. 130 million meisjes en vrouwen in de wereld heeft mee te maken met besnijdenis.

Het komt vaak voor in 28 landen in Afrika en in sommige landen in Azië en de Midden-Oost. Voorbeeld van landen in Afrika zijn, o.a. Egypte, Soedan, Ethiopië, Eritrea, Somalië, Kenia, Tsjaad, Mauritanië, Mali, Guinee, Burkina Faso, Sierra Leone, Nigeria en Gambia.

Vormen van vrouwenbesnijdenis.

1. **Incisie:** Er wordt een klein sneetje in de voorhuid van de clitoris gemaakt met als reden een beetje bloed te laten vloeien.
2. **Clitoridectomie:** Bij deze vorm wordt de clitoris weggehaald
3. **Excisie:** Bij deze vorm worden de clitoris en de kleine schaamlippen geheel of gedeeltelijk weggehaald
4. **Infibulatie (faraonische besnijdenis)** Bij deze worden de clitoris, kleine en grote schaamlippen geheel of gedeeltelijk verwijderd. Na aaneenhechting van de resterende schaamlippen blijft een kleine opening over voor urine en menstruatiebloed. Somaliërs noemen de eerste twee typen van besnijdenis "sunna".

Als gevolg van vrouwenbesnijdenis zijn lichamelijke gevolgen direct en op langere termijn te onderscheiden.

Directe gevolgen

1. **Extreme pijn:** De ingreep gebeurt vaak zonder plaatselijke verdoving. Door de angst en de intense pijn kan het meisje in shocktoestand raken.
2. **Bloeding:** Vlak na de besnijdenis kan een bloeding ontstaan. Deze is het gevolg van de verwijdering van de clitoris en/of de beschadiging van de kleine bloedvaten. Het bloedverlies kan zo ernstig zijn, dat het meisje eraan sterft.
3. **Kans op acute infectie:** Gezien de onhygienische omstandigheden, zoals het gebruik van onsteriele mesjes en traditionele geneesmiddelen voor de genezing van de wond, kan een ernstige infectie ontstaan. Soms loopt het pas besneden meisje hierdoor septicemie of tetanus op.
4. **Het vasthouden van urine:** Vlak na de besnijdenis komt het bijna altijd voor, dat het meisje haar urine langdurig, soms 48 uur vasthoudt. Door de ingreep is het urineren te pijnlijk. Er kan hierdoor een ontsteking ontstaan. Bovendien kunnen zich vagina-stenen vormen door het achterblijven van urine in de vagina.
5. **Herinfibulatie:** Een paar weken na de ingreep wordt de vaginale opening van het meisje door de uitvoerster van de besnijdenis gecontroleerd. In het geval van een niet geslaagde infibulatie wordt de vagina opnieuw gehecht. Dit gebeurt meestal in het geval van een infectie of bij het voorkomen van problemen bij het urineren. Het herhalen van de ingreep kan onrust en angst bij het meisje oproepen. Zij kan er emotioneel door beschadigd worden.



Motto: respect

Gevolgen op langere termijn

1. Pijnlijke menstruatie

Het komt vaak voor dat een ongehuwd meisje last van buikpijn en menstruatieklasten heeft. Pijnstillers zijn hierbij het enige medicijn. De vagina-opening kan te nauw zijn om het menstruatiebloed door te laten. Deze obstructie van menstruatiebloed kan een ontsteking tot gevolg hebben. Soms loopt het menstruatiebloed zich op in de vagina of in de baarmoeder

2. Chronische infectie

Ten gevolge van het niet goed kunnen doorstromen van urine en menstruatiebloed kan een chronische ontsteking van het bekken, vagina of urinewegen ontstaan.

Een opstijgende infectie van het bekken kan onvruchtbaarheid veroorzaken. Cysten van huidweefsel en abscessen in de vagina kunnen zeer groot worden

3. Huwelijksnacht

Als het meisje in het huwelijk treedt moet de vernauwde vaginale opening weer vergroot worden. Tijdens de huwelijksnacht moet de man zelf de vaginale opening forceren of wordt er een defibulatie uitgevoerd door een traditionele vroedvrouw, een getraind arts of verpleegkundige. Hierna moet meteen een geslachtsgemeenschap plaats vinden, hetgeen erg pijnlijk is. De meeste vrouwen lijden in het algemeen veel pijn bij seksuele omgang

4. De bevalling

De bevalling van een kind verloopt vaak erg moeilijk. De huid van de vulva is niet meer zo elastisch. Tijdens de bevalling kunnen de organen gedeeltelijk of geheel inscheuren. Het kan een dodelijke afloop hebben voor de moeder of het kind.

5. Psychologische gevolgen

De sociale druk om je te laten besnijden is groot. Toch is het een traumatische gebeurtenis, die angst en nachtmerries tot gevolg kan hebben. De pijnlijke herinnering en de verlittekening van de vulva kunnen een seksuele relatie negatief beïnvloeden. Schaamte, en pijn blijven de vrouwen vaak levenslang achtervolgen.



Motto: respect

Nederland en Meisjesbesnijdenis

In Nederland zijn alle vormen van meisjesbesnijdenis wettelijk verboden sinds 1993. Het is schadelijk voor de gezondheid. Het meisje kan er pijn van worden, veel buikpijn krijgen, later problemen krijgen met het baren van kinderen en nog veel meer. Het besnijden van meisjes is een schending van mensen-kinder-en vrouwenrechten.

Als een meisje dat in Nederland woont besneden wordt, is het mogelijk dat de ouders naar de gevangenis moeten. Het is mogelijk dat een meisje onderzocht wordt, om te onderzoeken of zij besneden is. Het is door de regering in Nederland vastgesteld dat ook de ouders van meisjes die buiten Nederland besneden worden, berecht kunnen worden.

Dat meisjesbesnijdenis verboden is, staat in Nederland in het wetboek van strafrecht artikel 300 t/m 304. Dit betekent dat het in de Nederlandse strafwetgeving valt binnen de algemene delictsomschrijving "mishandeling". In artikelen 300, lid 4 Sr wordt opzettelijke benadeling van gezondheid gelijkgesteld aan mishandeling. Naast degene die deze handelingen mede plegen, uitlokken dan wel medeplichtig zijn

De World Health Organisation (WHO) is tegen alle vormen van meisjesbesnijdenis en stelt dat het schadelijk is voor de gezondheid van meisjes en vrouwen.

Meer informatie kunt u vinden bij WHO (www.who.org) , Unicef (www.unicef.org) of bij Amnesty (www.amnesty.org). Elk land ter wereld heeft een organisatie waar u uitgelegd wordt waarom meisjes beschermd moeten worden tegen besnijdenis. In Nederland, o.a www.africalife.nl en www.tegenmeisjesbesnijdenis.nl